

《外科治療後の注意事項》

- * 麻酔が切れる約2～3時間の間、飲食は控えてください。
(熱いものはやけどの原因となりますのでご注意ください。)
- * 出血が多いようでしたら、ガーゼを2～3枚重ねて小さく折り、患部に当てて30分間、強く噛んで下さい。
- * 処置後2～3日間は、つばに混じって血が出ることがあります。

ただし、圧迫止血をしても直ぐに口内が血液でいっぱいになるような出血の際には直ぐに連絡をして下さい。処置が必要な場合があります。

- * 処置後、数日間は激しいうがいを避け、つばを吐くか、または口の中に水を含んで出す程度にしてください。
熱いお風呂・煙草・お酒、激しい運動は、数日間避けて下さい。シャワー程度が望ましいです。
- * 歯ブラシは通常通り行って下さい。痛みがあるようでしたら、軽く行うか、患部（痛い部分）を避けて行って下さい。
- * お薬は、指示どおりに最後まで服用して下さい。
- * 処置後の痛みは概ね1～2日、腫れは2～3日後に強くなります。
- * 患部を冷やす際は、6～8時間までを目安として下さい。
- * 通常処置後の消毒と1～2週間後に抜糸（糸を取る）を行います。
- * 抜歯処置の場合、骨の強度が一時的に低下することがありますので、骨の状態が安定するまで（3～4ヶ月）は下顎骨に強い外力が加わらないようにご注意ください。
(非常に強い食いしばり、ボクシング、ラグビー等の激しいスポーツ)
- * 今回の処置に伴う合併症発生の可能性として、神経障害、術後感染症や術後出血等が考えられます。
- * その他、ご不明な点、気になる点、または異常と思われる点がございましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。



Primary Dental Care

尾山台